

ワクチンの取り扱いについて

令和5年2月13日時点

新型コロナウイルスワクチンの特性					
区分	ファイザー社（12歳以上）	ファイザー社（5～11歳）	ファイザー（6か月～4歳）	武田社（ノババックス）	
回数	1・2回目	21日間隔で2回	21日間隔で2回	・21日間隔で2回	21日間隔で2回
	3回目	1回（初回接種から3か月以上）	1回（初回接種から5か月以上）	・55日以上の間隔をおいて1回	1回（初回接種から 6か月以上 ）
	4回目	1回（3回目接種から3か月以上）	—	—	1回（前回接種から 6か月以上 ）
	5回目	—	—	—	1回（前回接種から 6か月以上 ）
接種対象者	1・2回目	12歳以上	1回目の接種時に5歳から11歳	1回目の接種時に6か月から4歳	12歳以上
	3回目	12歳以上	5歳から11歳	—	18歳以上
	4回目	・60歳以上 ・18歳以上の基礎疾患がある方等 ・18歳以上の医療従事者等	×（使用不可）	×（使用不可）	18歳以上
	5回目	×（使用不可）	×（使用不可）	×（使用不可）	18歳以上
接種部位	三角筋に筋肉内接種	三角筋に筋肉内接種 ※明らかに三角筋の筋肉量が少ない場合については、大腿前外側部に接種可能	通常：三角筋中央部又は大腿前外側部に筋肉内接種 1歳未満：大腿前外側部に筋肉内接種 ※ 臀部には接種不可	三角筋に筋肉内接種	
希 積	1.8mlで希積	1.3mlで希積	2.2mlで希積	希積不要	
接種量	毎回0.3ml	毎回0.2ml	毎回0.2ml	毎回0.5ml	
1バイアルの単位	6回分（特殊な針・シリンジ） 5回分（一般的な針・シリンジ）	10回分	10回分	10回分	
最小流通単位 （一度に接種会場に配送される最小の数量）	195バイアル （特殊な針・シリンジを用いる場合は1,170回接種分、一般的な針・シリンジを用いる場合は975回接種分）	10バイアル（100回接種分）	10バイアル（100回接種分）	1バイアル（10回接種分）	
保管温度	－75℃±15℃： 18か月 －20℃±5℃：14日 ※なお、1回に限り、再度－90℃～－60℃に戻し保存可。 2～8℃：1か月	－75℃±15℃： 18か月 2～8℃：10週間	－75℃±15℃： 18か月 2～8℃：10週間	2～8℃：9ヶ月	
備考	・冷蔵庫で解凍する場合は、解凍及び希釈を1か月以内に行う ・室温で解凍する場合は、解凍及び希釈を2時間以内に行う ・希釈後、室温で6時間	・冷蔵庫で解凍する場合は、冷蔵庫で10週間。使用前、室温で24時間（希釈後は12時間以内） ・室温で解凍する場合は、24時間（希釈後は12時間以内）	・冷蔵庫で解凍する場合は、冷蔵庫で10週間。使用前、室温で24時間（希釈後は12時間以内） ・室温で解凍する場合は、24時間（希釈後は12時間以内）	【一度針をさしたもので以降】 2～25℃で6時間	

ワクチンの取り扱いについて

令和5年2月13日時点

オミクロン株に対応した2価ワクチンの特性			
		ファイザー社（オリジナル株/BA.1株の2価ワクチン、 オリジナル株/BA.4-5株の2価ワクチン）	モデルナ社（オリジナル株/BA.1株の2価ワクチン、 オリジナル株/BA.4-5株の2価ワクチン）
回数	3回目以降	1回（前回接種から3か月以上）	1回（前回接種から3か月以上）
接種対象者		初回接種を終えた12歳以上の者	初回接種を終えた 12歳以上 の者
接種部位		三角筋に筋肉内接種	三角筋に筋肉内接種
希 釈		希釈不要	希釈不要
接種量		0.3ml	0.5ml
1バイアルの単位		6回分（特殊な針・シリンジ）	5回分
最小流通単位（一度に接種会場に配送される最小の数量）		195バイアル（特殊な針・シリンジを用いる場合は1,170回接種分）	10バイアル（50回接種分）
保管温度		- 75°C±15°C： 18か月 - 20°C±5°C：不可 2～8°C：10週間	- 20°C±5°C：9か月 2～8°C：30日 ※9か月の有効期間中に限る
備考		・室温では24時間以内に使用する （一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の再凍結は不可）	（一度針をさしたもので以降） 2～25°Cで12時間 （解凍後の再凍結は不可）