

# 副反応かな？



## と思ったら

**注射部位の痛み**

**疲労 頭痛 筋肉痛**

**悪寒 発熱 など**



・比較的起きやすい副反応です

・接種後数日以内に回復しています

※2日間以上熱が続く場合や、症状が重い場合、ワクチンでは起こりにくい症状がある場合には、**かかりつけ医**や**接種医**へご相談ください。

医療機関への相談が難しい場合は、コールセンターもご利用いただけます。

**【受付時間 ▶ 毎日(3/31まで) 9:00 ~ 20:00】**

**福島県 新型コロナワクチン 副反応コールセンター**



**0120-336-567** (フリーダイヤル)

**福島県 新型コロナワクチン子ども相談窓口**



**0120-191-567** (フリーダイヤル)

福島県副反応コールセンター 及び 子ども相談窓口は

**令和6年3月31日(日)で終了** します。

新型コロナワクチン全般に関する相談

**○厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター**



**0120-761-770** (フリーダイヤル)

受付時間▶毎日 9:00~21:00

※令和6年4月1日以降も引き続きご利用いただけます。

# 新型コロナワクチンを接種した方へのお願い

ワクチン接種後も、  
必要な場面では  
マスクの着用や手指消毒などの  
感染予防対策を  
お願いします！



福島県  
復興シンボルキャラクター

キビタン

ワクチンの効果は100%ではありません。ワクチンを接種していても感染するブレークスルー感染によって誰かに感染させてしまうケースやオミクロン株については、これまでのワクチン接種の効果への影響などが指摘されています。また、変異によりワクチンの効果に影響が生じる可能性もあります。

このため、ワクチン接種後も「マスクの着用」や「手洗い」、「換気」など、自分の体調や周囲の状況に応じて、必要な感染対策をお願いします。症状がある場合に外出をする際は、人混みは避け、マスクを着用しましょう。

## 新型コロナワクチン副反応についてよくある質問

### Question.

ワクチンを受けた後に  
熱が出たら  
どうすれば良い  
ですか？



**Answer.** ワクチンによる発熱は接種後1～2日以内に起こることが多く、水分を十分に摂取し、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用いただくなどして、様子を見ていただくこととなります。

ワクチンによる発熱か、新型コロナウイルス感染症による発熱かを見分けるには、発熱以外に咳や咽頭痛、鼻水、味覚・嗅覚の消失、息切れ等の症状がないかどうか、手がかりとなります（ワクチンによる発熱では、通常、これらの症状はみられません。）

ワクチンを受けた後、2日間以上熱が続く場合や、症状が重い場合、ワクチンでは起こりにくい上記の症状がみられる場合には、医療機関等への受診や相談をご検討ください。

（厚生労働省ホームページより）