

## 麻疹(はしか)の感染事例が報告されています

**麻疹とは**、麻疹ウイルスがヒトに感染することで引き起こされる急性の全身感染症です。免疫力がない人が感染すると、ほぼ100%発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。

麻疹ウイルスの感染経路は、主に空気感染で、その感染力は非常に強いと言われています。

麻疹の免疫がない集団に1人の発症者がいたとすると、12～14人の人が感染するとされています。(インフルエンザでは1～2人)

### 感染すると・・・

約10日後に風邪のような症状が2～3日続き高熱や発疹が出現


①咳

②微熱

③鼻水

④39℃以上の高熱

⑤発疹



・肺炎、中耳炎を合併しやすい！

・1/1000人が脳炎を発症

・1/1000人が死亡

県南地域では、平成30年に海外渡航者からの感染拡大により10件の報告がありましたが、それ以降、報告はありません。

全国では、麻疹の感染事例の発生が多く報告されており、注意が必要です。

令和7年麻疹発生状況 (R7.3.13現在)

発症日	届出日 (確定日)	地域	発症日	届出日 (確定日)	地域
1月12日	未公表	東京都	2月12日	3月3日	山口県宇部市
1月21日	1月30日	岡山県岡山市	2月26日	(3月3日)	兵庫県神戸市
1月31日	2月3日	岡山県倉敷市	2月26日	3月5日	茨城県
2月16日	2月20日	大阪府大阪市	3月1日	3月5日	岐阜県安八郡神戸町
2月14日	2月21日	愛知県春日井市	3月2日	(3月6日)	奈良県奈良市
2月17日	2月25日	神奈川県横浜市	3月1日	3月6日	兵庫県明石市
2月18日	2月27日	神奈川県横浜市	2月26日	3月7日	千葉県市川市
2月23日	2月28日	宮城県仙台市	3月6日	(3月10日)	埼玉県
2月28日	(3月1日)	愛知県名古屋市			

## 定期接種の対象になったら早めの予防接種を！

麻疹は、手洗い・マスクのみでは十分に防げません！ワクチンの接種が最も重要です。

### 【1回目接種】

1歳になったら早めに  
(1歳～2歳未満)

### 【2回目接種】

小学校入学前の1年間  
(5歳～7歳未満)



1回接種で95%、2回接種で99%以上の  
人に免疫がつくと言われています。  
必ず2回ワクチン接種をしましょう！

・定期接種の対象にない方で、「麻疹にかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことがない方」はかかりつけの医師にご相談ください。

・麻疹にかかったことがなく、2回の予防接種を受ける機会がなかった方で、特に医療関係者や児童福祉施設等の職員等、麻疹にかかるリスクが高い方や麻疹にかかることで周りへの影響が大きい場合は、2回目の予防接種についてかかりつけ医にご相談ください。

FAX

MAIL

発行元：福島県県南保健所生活衛生部医療薬事課

0248-23-1252

kansen\_kennan@pref.fukushima.lg.jp

「県南地域感染症情報」に関する御意見、御質問等はFAX及びメールでお願いします。