

令和7年 水稻病虫害発生状況（8月）

1 調査の概要

- (1) 巡回調査地点・ほ場数… 中通り： 14 地点・ 112 ほ場
 会 津： 9 地点・ 72 ほ場
 浜通り： 8 地点・ 64 ほ場
- (2) すくい取り調査地点数… 中通り： 15 地点
 会 津： 10 地点
 浜通り： 9 地点

2 葉いもち

発生ほ場割合は、中通り、会津で平年よりやや低くなり、浜通りでは発生は見られませんでした（図1）。




図1 葉いもちの発生状況（8月上旬）

3 穂いもち

会津で高く、中通り、浜通りで平年並となりました。発生程度はいずれも少発生以下でした（図2）。出穂後の降雨により、感染が助長されたと考えられます。




図2 穂いもちの発生状況（8月下旬）

4 紋枯病

8月上旬の発生ほ場割合は、中通りで平年並、会津、浜通りで高くなりました（図3）。
8月下旬の発生ほ場割合は、全域で高くなりました（図4）。




図3 紋枯病の発生状況（8月上旬）




図4 紋枯病の発生状況（8月下旬）

5 稲こうじ病

8月下旬の調査では、会津の一部ほ場で発生を確認しましたが、発生程度はいずれも「微」でした（図5）。




図5 稲こうじ病の発生状況（8月下旬）

6 ごま葉枯病

8月下旬の発生ほ場割合は、中通り、浜通りで平年より高く、会津では平年よりやや低くなりました（図6）。




図6 ごま葉枯病の発生状況（8月下旬）

7 イネツトムシ（イチモンジセセリ）

8月上旬の発生ほ場割合は、中通りで平年より低く、会津、浜通りでは発生は確認されませんでした（図7）。

8月下旬の発生ほ場割合は、中通りで平年よりやや低くなり、会津、浜通りでは発生は確認されませんでした（図8）。




図7 イネツトムシの発生状況（8月上旬）




図8 イネツトムシの発生状況（8月下旬）

8 イネアオムシ（フタオビコヤガ）

8月上旬、下旬ともに発生は確認されませんでした。

9 斑点米カメムシ類

8月上旬の調査では、発生ほ場割合は中通りで平年よりやや低くなり、会津で平年並、浜通りでやや高くなりました（図9）。

8月下旬の調査では、発生地点割合は中通りで平年並、会津で平年よりやや低くなり、浜通りで平年より低くなりました（図10）。令和6年の会津は天候の影響により「結果なし」としています。

発生種別では、全域でカスミカメムシ類、中通りと浜通りの一部ほ場でクモヘリカメムシが捕獲されました（図11）。




図9 水田内すくい取り調査による斑点米カメムシ類の発生状況（8月上旬）




図10 水田内すくい取り調査による斑点米カメムシ類の発生状況（8月下旬）

※：結果なし




図 11 水田内すくい取り調査による斑点米カメムシ類の種別発生状況（8 月下旬）

注 1）左上：中通り、右上：会津、左下：浜通り、右下：県全体

注 2）アカスジ：アカスジカスミカメ、アカヒゲ：アカヒゲホソミドリカスミカメ

ホソハリ：ホソハリカメムシ、クモヘリ：クモヘリカメムシ

イネカメ：イネカメムシ

注 3）令和 6 年の会津は天候の影響により「結果なし」