

令和7年 ダイズ病害虫発生状況（9月）

1 調査の概要

- （1）巡回調査地点・ほ場数… 中通り： 3地点・ 9ほ場
会津： 3地点・ 9ほ場
浜通り： 3地点・ 9ほ場
- （2）見取り調査、払落し調査ともに1ほ場当たり25株調査

2 病害

（1）黒根腐病

白河市、会津若松市の一部で発生が確認されました。

3 虫害

（1）アブラムシ類

1小葉当たり平均寄生頭数は、全域で平年より少なくなりました（図1）。




図1 アブラムシ類の発生状況（9月）

（2）フタスジヒメハムシ

払落し調査での発生は、中通りで例年並、会津で例年より高く、浜通りで例年より少なくなりました（図2）。




図2 払落し調査によるフタスジヒメハムシの発生状況（9月）

注）例年：過去4年平均

(3) 吸実性カメムシ類

見取り調査での発生は、中通りで平年より少なく、会津、浜通りで平年並となりました（図3）。
 払落し調査での発生は、中通りで例年より少なく、会津、浜通りで例年並となりました（図4）。
 主な発生種はホソヘリカメムシ、ブチヒゲカメムシ、イチモンジカメムシでした（図5）。




図3 見取り調査による吸実性カメムシ類の発生状況




図4 払落し調査による吸実性カメムシ類の発生状況（9月）




図5 払落し調査による吸実性カメムシ類の種別発生状況（県全体、9月）

注1) ホソヘリ：ホソヘリカメムシ、ブチヒゲ：ブチヒゲカメムシ
 イチモンジ：イチモンジカメムシ、アオクサ：アオクサカメムシ
 クサギ：クサギカメムシ の略

注2) 例年：過去4年平均