

キクの病害虫の発生状況（8月中下旬）

1 白さび病

巡回調査における発生ほ場割合は平年並でしたが、一部で発病株率の高いほ場が確認されています(図1)。多湿条件が続くと発病しやすくなるので、予防散布を心がけてください。また、本病は、キクの品種によって発病に差があるので、発病しやすい品種では、特に防除を徹底してください。




図1 白さび病の発生状況

2 アブラムシ類

巡回調査における発生ほ場割合は、平年並でした(図2)。ほ場をよく観察し、発生が確認される場合は早期防除を実施してください。




図2 アブラムシ類の発生状況

3 アザミウマ類

巡回調査における発生ほ場割合は平年より高く、寄生株率の高いほ場が確認されています(図3)。ほ場周囲の雑草が発生源となることが多いので、除草を徹底してください。発生種がミカンキイロアザミウマの場合は、効果の高い薬剤が少ないので、薬剤の選択に注意してください。また、本種は、TSWV等のウイルスを媒介するので注意が必要です。




図3 アザミウマ類の発生状況

4 ハダニ類

巡回調査における発生ほ場割合は、平年並でしたが、一部で寄生葉率の高いほ場が確認されています（図4）。多発すると防除が困難になるので、ほ場をよく確認して、低密度時から防除を徹底してください。薬剤防除を行った場合には、防除の2～3日後に葉裏を観察し、効果が十分でない場合には、異なる系統の薬剤で防除を行ってください。




図4 ハダニ類の発生状況

5 オオタバコガ

巡回調査における発生ほ場割合は平年並でしたが、被害茎率の高いほ場が確認されています（図5）。幼虫が寄生する生長点付近を中心によく観察し、発生が見られた場合には防除を実施してください。




図5 タバコガ類の発生状況

※キクの巡回調査は、下記の 11 箇所を巡回調査地点としています。




図 キクの巡回調査地点

※網掛け：キクの巡回調査地点、5 市町村、11 地点

※★：オオタバコガのフェロモントラップ地点、8 地点

● 情報内容への質問や要望は、福島県病虫害防除所まで御連絡ください。

Tel:024-958-1709

Fax:024-958-1727

e-mail:yosatsu@pref.fukushima.lg.jp