

令和7年度 適期刈取りについて

令和7年8月 26 日

県北農林事務所農業振興普及部

○刈取り適期の判定は、出穂後の積算気温を参考にして、ほ場の籾黄化率によって決定します。

【積算気温の見方】

- ・積算気温とは、出穂期の翌日以降の日平均気温を合計した気温です。
- ・刈取り目安の出穂後積算気温：1,000℃前後～1,200℃
- ・積算気温が 1,200℃ を超えると急激に胴割粒が発生し、落等の要因となります。

ひとめぼれ 夢の香 福乃香	天のつぶ 五百万石	コシヒカリ	福笑い
950℃	1,000℃	1,000～1,050℃	1,050℃

【籾黄化率の見方】

- ・平均的な株の穂を観察しましょう。籾の80～90%程度が黄化している時期がそのほ場の刈取り適期です。

表1 アメダス福島ofデータを用いた刈取り適期の目安(8月26日現在)

出穂期		7月25日	8月1日	8月5日	8月10日	8月15日	8月20日
積算 気温	950℃	8月29日	9月6日	9月11日	9月17日	9月24日	10月1日
	1,000℃	8月31日	9月9日	9月14日	9月20日	9月26日	10月4日
	1,200℃	9月8日	9月18日	9月23日	9月30日	10月7日	10月16日

※アメダス福島の所在地は「福島市松木町 福島地方气象台」(北緯：37度45.5分、東経：140度28.2分、標高：67m)です。実際のほ場における気温とは異なる点にご注意ください。

表2 アメダス二本松のデータを用いた刈取り適期の目安(8月26日現在)

出穂期		7月25日	8月1日	8月5日	8月10日	8月15日	8月20日
積算 気温	950℃	8月30日	9月7日	9月13日	9月19日	9月26日	10月4日
	1,000℃	9月1日	9月10日	9月15日	9月22日	9月29日	10月7日
	1,200℃	9月10日	9月19日	9月26日	10月3日	10月11日	10月20日

※アメダス二本松の所在地は、「二本松市金色久保」(北緯：37度35.0分、東経：140度25.8分、標高：235m)です。実際のほ場における気温とは異なる点にご注意ください。

※上表の積算気温は令和7年8月25日まで本年実測値の日平均気温を使用し、それ以降は平年値を使用しています。

本資料は県北農林事務所農業振興普及部HPでも公開しています。

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36210a/r7-suitoukaritori.html>

