

令和8年度 適期刈取りについて

令和8年9月8日
県北農林事務所農業振興普及部

○刈取適期は、出穂後積算気温による刈取適期に達し、籾黄化率が80～90%程度になった時期です。ただし、出穂後積算気温が1,200℃に達する前に刈り取りましょう。

1 出穂後積算気温による刈取適期

出穂後積算気温とは、出穂期の翌日以降の日平均気温を合計した気温です。

出穂後積算気温による刈取適期の早限は品種によって異なります（表1）。

出穂後積算気温が1,200℃を超えると胴割粒の発生が多くなり、落等や食味低下の要因となります。

表1 出穂後積算気温による品種ごとの刈取適期の早限

ひとめぼれ 夢の香、福乃香	天のつぶ 五百万石	コシヒカリ	福笑い
950℃	1,000℃	1,000～1,050℃	1,050℃

表2 刈取適期の予測（9月8日現在）

	出穂期	各出穂後積算気温の到達予想日		
		950℃到達日	1000℃到達日	1200℃到達日
福島市	7月25日	9月2日	9月4日	9月13日
	8月1日	9月9日	9月11日	9月21日
	8月5日	9月13日	9月15日	9月25日
	8月10日	9月19日	9月22日	10月2日
	8月15日	9月25日	9月28日	10月9日
	8月20日	10月2日	10月5日	10月17日
二本松市	7月25日	9月3日	9月6日	9月15日
	8月1日	9月11日	9月13日	9月24日
	8月5日	9月15日	9月18日	9月28日
	8月10日	9月22日	9月24日	10月6日
	8月15日	9月28日	10月1日	10月13日
	8月20日	10月6日	10月9日	10月22日

※出穂後積算気温は令和8年9月7日までは本年実測値の日平均気温、それ以降は平年値を使用して算出しています。

※福島市はアメダス福島（福島市松木町（北緯：37度45.5分、東経：140度28.2分、標高：67m）、二本松市はアメダス二本松（二本松市金色久保（北緯：37度35.0分、東経：140度25.8分、標高：235m））の観測データに基づき算出しています。実際のほ場における気温とは異なる点にご注意ください。

2 籾の黄化率による刈取適期

- ・平均的な生育の株の穂を観察し、籾の80～90%程度が黄化している時期がそのほ場の刈取適期です。

本資料は県北農林事務所農業振興普及部HPでも公開しています。

